

Avertissements agricoles



BULLETIN TECHNIQUE DE LA STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES POITOU-CHARENTES

GRANDES CULTURES

Bulletin n° 202 (10/91) du 28 MAI 1991

| | |
|-----------------|---|
| CEREALES | : Surveiller les pucerons des épis |
| MAIS | : Traitement sésamie dans les zones concernées première semaine de Juin |
| POIS | : Attention aux pucerons |

BLE

Stade : pleine épiaison.

MALADIES

Situation

Septoriose : Des symptômes apparaissent sur dernières feuilles en sols limoneux dans les parcelles non protégées depuis le 15 avril.

Rouille brune : Seuls les semis précoces peuvent être concernés par une expression des symptômes courant floraison dans les parcelles non protégées préventivement.

Rouille jaune : Quelques rares foyers sont observés en Charente-Maritime et à la limite Sud-Ouest des Deux-Sèvres (Saint Georges de Rex). Depuis vingt jours, aucune contamination n'est possible. Risques désormais nuls.

INSECTES

Situation

Agromyza : Des mines sont en évolution dans les parcelles touchées non traitées.

Pucerons des épis : Présence ponctuelle, de nombreux auxiliaires sont également observés.

Préconisation

Parcelles ayant reçu un traitement fongicide depuis le début gonflement : La protection est suffisante.

Parcelles n'ayant pas reçu de traitement depuis le début gonflement :

- intervenir rapidement en sols limoneux ;
- intervenir dans les autres situations seulement si le potentiel reste supérieur à 60 quintaux/hectare.

MAIS

Situation

Le vol de sésamie a débuté dans la semaine du 20 Mai en Charente-Maritime et en Charente dans les zones concernées par une intervention systématique en première génération (voir carte bulletin n° 199 (07/91) du 17 Avril 1991). Il devrait s'étaler sur un mois.

P. 18



Direction Régionale de l'Agriculture et de la Forêt
SERVICE REGIONAL
DE LA PROTECTION DES VEGETAUX
13, Rte de la Forêt - BIARD
86000 POITIERS Tél. : 49.58.39.02

Publication périodique - Imprimerie de la Station Poitou-Charentes
Directeur Gérant : J. P. PIQUEMAL
CPPAP n° 1664 A.D. Abonnement annuel :
Chèque bancaire ou postal à l'ordre du
sous régisseur de recettes Avertissements Agricoles

Préconisation

Selon la date d'arrivée de la culture au stade "2 feuilles", les dates d'intervention en première génération dans la zone un (Sud de la ligne La Rochelle - Angoulême) sont les suivantes :

| Date d'arrivée au stade "2 feuilles" | Date du 1er traitement | Date du second traitement |
|---|---------------------------|------------------------------|
| 16 au 20 mai | 3 au 6 juin | 18 au 21 juin |
| 21 au 25 mai | 8 au 11 juin | 23 au 26 juin |
| 26 au 30 mai | 12 au 14 juin | 27 au 29 juin |
| 31 mai au 5 juin | 15 au 17 juin | Inutile |
| 6 juin au 10 juin | 18 au 21 juin | Inutile |
| 11 au 15 juin | 21 au 25 juin | Inutile |
| Au-delà du 16 juin | Inutile | Inutile |

En zone 2, la surveillance est indispensable. Fendre 100 pieds de maïs au hasard début Juin et intervenir si plus de 3 % des pieds sont porteurs de larves. (Rechercher les larves en fendant les plantes).

Modalités de traitement

Utiliser les insecticides aux doses homologuées, et traiter par voie terrestre (tracteurs) avec des jets pinceaux sans réduire les volumes d'eau :

300 l/ha en localisé

400 l/ha en plein

500 l/ha à partir du stade 8 feuilles.

Dans le cas de mélanges avec un désherbant de rattrapage, se renseigner sur la compatibilité des produits chez les firmes concernées.

COLZA

Stade : G4 (10 premières siliques bosselées).

PUCERONS CENDRES DU CHOU**Situation**

Pas de captures à la tour à succion de Poitiers, non observé en culture ou faiblement.

Préconisation

Pas d'intervention.

ALTERNARIA**Situation**

Pas présent pour l'instant.

Préconisation

Ne pas intervenir.

.../...

POIS

Stade : Début floraison à plein floraison.

PUCERONS

Situation

Les captures d'ailés se sont intensifiées. Des pullulations sont déjà observées dans les Charentes et en Deux-Sèvres. On assiste à une augmentation très rapide des populations en Charente-Maritime. Le début de la colonisation est constaté en Vienne.

Préconisation

La situation variant énormément d'une parcelle à l'autre, faire une observation rapide avant de décider d'intervenir. Un traitement se justifie si vous avez en moyenne 30 pucerons par plantes.

TORDEUSES

Situation

Tout début du vol.

Préconisation

Il est trop tôt pour intervenir.

MALADIES

Situation

Le temps n'a pas été favorable à l'évolution des maladies. L'Anthracnose est toujours cantonnée sur les feuilles basses. Pas de botrytis.

Pois irrigués : renouveler votre protection 15 jours après le premier traitement.

Pois non irrigués : le premier traitement est toujours possible.

Note : Si vous observez de l'anthracnose, privilégier un produit efficace contre cette maladie.

TOURNESOL

Stade : de levée à 4 paires de feuilles.

PUCERONS

Situation

Le vol de pucerons de tournesol (*Brachycaudus helichryi*) a débuté la dernière décade de Mai. Les premières colonies sont déjà observées en petit nombre en culture.

Préconisation

Il est trop tôt pour intervenir. Un traitement est justifiée lorsque l'on a au moins 30 pucerons par plante (de la levée au stade 5 paires de feuilles).

P.119

SCLEROTINIA DU BOURGEON TERMINAL

Situation

Des contaminations sont possibles sur **bourgeon terminal** lorsque des pluies importantes se produisent entre le stade "6 feuilles" et le stade E1 ("bouton floral visible"). Des attaques au collet (pourriture de la base du pied) et sur tige sont possibles tout au long de la végétation. Des attaques de capitule peuvent intervenir après des pluies importantes pendant la floraison.

Préconisation

Toute intervention est actuellement inutile. Un traitement pour protéger le **bourgeon terminal** pourra être envisagé avec un produit homologué uniquement en présence de variétés sensibles (VIDOC, VIKI, MIRASOL) sur sols limoneux et terre de marais, dès que les conditions climatiques seront favorables aux contaminations (humectation des feuilles pendant 2 jours au moins). Une efficacité correcte sera obtenue si le traitement est effectué avant la contamination ou au plus tard 5 jours après. Une interventions chimiques sur attaque au collet ou sur capitule sera **dans tous les cas** inutile car inefficace.

CAMPAGNOLS DES CHAMPS

Situation

Dans plusieurs secteurs où les populations étaient élevées cet hiver, on observe actuellement une forte activité dans les prairies (RGI, luzernes). Généralement, la pénétration est faible dans les céréales, sauf dans les parcelles touchant des prairies fortement infestées.

Préconisation

Surveiller les céréales "à risques" et intervenir si l'on observe des dégâts.

(C) SERVICE REGIONAL DE LA PROTECTION DES VEGETAUX

Toute reproduction, même partielle, est soumise à notre autorisation